

SKUDDTREFF, REAKSJON OG VIRKNING

Treff	Viltets reaksjon	Skuddplass	Blod	Skuddvirkning
Bryst	Stormende flukt, steil i fronten, med senket hode	Middels lange snitthår	Mørkt-middels rødt	Dødelig, kan gå 100-200 m.
Høyt bogskudd	Utrusing med høy, bratt front	Lungefragmenter, lange snitthår	Lyst blod med luftbobler eller skum	Dødelig, ved treff utenom lungene kan det bli lange ettersøk
Lever	Beveger seg langsomt og stivt, vil som regel krumme ryggen	Korte til middels lange snitthår. Små bloddråper, leverfragment.	Mørkt til brunrød, bitter smak.	Dødelig, vil raskt gå i sårleie. Død etter 1-2 timer.
Nyrer	Detter som oftest i skuddet, men er raskt oppe igjen og flykter med utstrakt hale.	Middels lange til lange snitthår. Som regel lite blod i små dråper.	Mørkt til middels rødt.	Dødelig, vil raskt gå i sårleie. Død etter 2-3 timer.
Vom	Kan virke sammenkrøket	Middels lange snitthår. Lite blod. Evt. vominnhold.	Middels rødt, ofte iblandet mageinnhold	Dødelig. Kan gå langt. Dør etter 12-24 timer.
Tarmer, lavt buktreff langt bak	Slår ofte bakut med bakbeina. Kan virke sammenkrøket og stiv, med krum rygg.	Middels lange snitthår. Blod iblandet tarminnhold. Tarmfett.	Middels rødt, iblandet tarminnhold.	Dødelig. Går raskt i sårleie. Dør etter 4-8 timer.
Skrellskudd (treff over ryggøyula eller i gevir)	Detter i skuddet. Sparker vilt med føttene, men er raskt oppe og flykter i stor fart. I begynnelsen noe ustødig.	Lange snitthår. Lite eller intet blod. Skinnfiller eller kjøttslintrer. Deler av gevir.	Middels rødt.	Dyret får som regel ikke varig mèn. Blir sjeldent avlivet under ettersøk.
Underkjeve	Ingen tydelig reaksjon, kan riste på hodet.	Korte snitthår, beinfliser (kan forveksles med fotskade). Deler av tenner.	Lyst til vassig rødt.	Skaden er ikke dødelig, men dyret vil etter lengre tid dø av tørste og sult.
Hals	Ingen tydelig reaksjon. Kan riste på hodet.	Middels lange til lange snitthår. Slimet blod, kan ha luftblærer.	Lyst til middels rødt.	Dør etter 3-8 timer.
Føtter	Knekker sammen i den trufne foten. Flykter raskt på tre føtter.	Korte snitthår. Bein fliser. Ved høye treff mye blod.	Middels rødt.	Som oftest ikke dødelig. Såret gror, men foten blir som regel ubrukelig.
Streifskudd	Kan se ut som gode treff, som bryst eller bogskudd. Flykter i stor fart.	Mye snitthår, litt kjøttblod, evt. skinnbiter og kjøttslintrer.	Middels rødt.	Ikke dødelig.